


## Điều Trị Thêm

Nhiều trẻ bị nhiễm trùng tai nhiều lần. Một số trẻ bị nhiễm trùng một lần thật lâu.

- Con quý vị có thể cần phải đến một bác sĩ chuyên khoa Tai, Mũi và Họng. Đôi khi bác sĩ chuyên khoa sẽ đề nghị luồn một ống nhỏ vào màng nhĩ. Ống này sẽ giúp đưa không khí vào trung nhĩ (phần tai giữa) để không bị tích tụ chất dịch.
- Một số trẻ có thể cần được giáo viên giúp thêm. Ngay cả chỉ bị lãng tai chút ít cũng khiến cho trẻ khó học hơn.
- Nên khám lại thính lực để bảo đảm đã trở lại bình thường.



**Ngay cả em bé cũng có thể thử được thính lực.**

## Thử Thính Lực

Thử thính lực miễn phí cho cư dân Vancouver từ 0-9 tuổi tại  
Audiology Centre  
tầng 3, 999 West Broadway,  
Vancouver

Gọi số 604-659-1100 để xin hẹn.



**Vancouver Coastal Health**


*Promoting wellness. Ensuring care.*

Muốn có thêm tài liệu này, đến  
<http://vch.eduhealth.ca> hoặc email [pthem@vch.ca](mailto:pthem@vch.ca)  
và nói Số Danh Mục **FI.300.M53.VI**  
© Vancouver Coastal Health, 2008/10

Chi tiết trong tài liệu này chỉ dành cho người được toán  
chăm sóc sức khỏe giao tài liệu này.  
[www.vch.ca](http://www.vch.ca)

## Các Trở Ngại Tai Giữa

### Middle Ear Problems



# Các Trở Ngại Tai Giữa

Trong hình dưới đây có khoanh tròn một phần tai. Phần tai này được gọi là tai giữa. Đôi khi chất dịch tích tụ trong tai giữa ngay phía sau màng nhĩ. Chất dịch này có thể bị nhiễm trùng. Tình trạng này cũng có thể làm điếc. Các trở ngại trong tai giữa được gọi là Viêm Tai Giữa (Otitis Media).

# Các Dấu Hiệu và Triệu Chứng

Có thể khó biết trẻ có bị trở ngại trong tai hay không.

Hãy để ý các dấu hiệu sau đây:

- kéo tai
- đau trong tai
- sốt hoặc lạnh
- không nghe rõ như bình thường
- có vẻ không chú ý
- bắt đầu nói chậm hơn những trẻ khác
- có vấn đề về hành vi
- khó chịu hoặc bực dọc

(Không phải trẻ nào cũng có cùng các triệu chứng này)

**Các trở ngại trong Tai Giữa rất thường xảy ra. 80-90% trẻ em sẽ bị trở ngại trong tai giữa ít nhất là một lần.**

TAI NGOÀI

SÓNG ÂM THANH

TAI GIỮA

TAI TRONG

MÀNG NHĨ

ĐÂY LÀ CHỖ CHẤT DỊCH CÓ THỂ TÍCH TỤ

VÒI EUSTACHE

**NHỮNG PHẦN CỦA TAI**

# Điều Trị

- Hãy đến bác sĩ ngay nếu quý vị nghĩ rằng trẻ bị nhiễm trùng trong tai.
- Bác sĩ thường có thể dùng thuốc để điều trị tai nhiễm trùng.
- Hãy đến bác sĩ tái khám sau khi dùng hết thuốc. Điều quan trọng là phải biết chắc đã hết chất dịch hoặc nhiễm trùng.
- Trẻ bị trở ngại tai giữa có thể cần được thử thính lực. Kết quả thử sẽ cho thấy có bị điếc hoặc lãng tai hay không, và tai giữa có hoạt động đúng mức hay không.
- Người thích hợp nhất để đến thử thính lực được gọi là Chuyên Viên Thính Lực. Họ được huấn luyện để thử thính lực cho trẻ nhỏ.

Cần phải điều trị để ngăn ngừa các trở ngại kéo dài.

**Trẻ em điếc hoặc lãng tai sẽ khó học tập và phát triển tiếng nói bình thường.**