

免疫注射資訊

乙型肝炎免疫注射

VACCINATION INFORMATION

Hepatitis B Vaccination
[Chinese]



由於免疫系統受到抑制，慢性腎病患者出現乙型肝炎併發症的風險較大。同時，他們進行透析時，可能要冒接觸到肝炎病毒的風險，風險雖然不高，但經常存在。

一旦要進行透析，病人及職員都有較大風險感染乙型肝炎。意外接觸到血液或其他體液是引致這種感染的原因。我們會採取預防措施保護你，其中一些例子是：

- 病人及職員經常徹底洗手
- 受過嚴格訓練的職員負責清潔透析機器
- 所有職員都穿戴手套

此外，我們採取進一步措施為你接種預防乙型肝炎疫苗，費用全免。疫苗在6個月內接種3次(分別在第0，第1及第6個月)。結果顯示可保障65-75%的病人免受乙型肝炎感染。



該種疫苗不含任何源自人類的物質。除極罕有的過敏反應外，一般人對疫苗都不會過敏。

可能的副作用包括注射位置的疼痛、發紅及腫脹、發熱、頭痛或頭昏，但這些症狀都是短暫的。

如果有以下情況，你不應接種這種疫苗：

- 過去曾對疫苗有過敏反應
- 對酵母或氫化鋁過敏。

如果你有其他有關本資訊的問題，請與腎科小組聯絡。

腎科小組電話號碼：

For more copies, go online at <http://vch.eduhealth.ca>
or email pchem@vch.ca and quote Catalogue No. **FP.450.H41.CN**
© Vancouver Coastal Health, November 2005

這文件內的資料，由醫療衛生人員特別為個別病人提供。
www.vch.ca