


## 額外治療

許多小孩不止一次耳朵受感染，有些小孩受的感染會持續一段長時間。

- 您的孩子可能需要見耳、鼻、喉專科醫生。有時這位專科醫生會建議在孩子的鼓膜放一條管，這條管會有助空氣通到中耳，使液體不會積聚。
- 有些小孩可能需要老師額外幫忙。即使喪失少許聽力，也會令小孩更難學習。
- 應再檢查聽覺，以確保是回復正常。



即使年紀很小的嬰兒也可接受聽力測驗。

## 聽力測驗

聽力學中心(Audiology Centre)  
為0至9歲的溫哥華居民免費提供聽力測驗，地址：

3<sup>rd</sup> floor, 999 West Broadway,  
Vancouver.

預約請電：604-659-1100。



Vancouver   
Coastal Health

*Promoting wellness. Ensuring care.*


欲多取幾份，可上網到 <http://vch.eduhealth.ca> 或電郵至 [phe@vch.ca](mailto:phe@vch.ca)，講出目錄編號 HED.580.CN  
溫哥華沿岸衛生局版權所有，2008/10

本文件內的資料只限得到醫療小組  
提供這些資料的人士使用。

[www.vch.ca](http://www.vch.ca)

## 中耳毛病

### Middle Ear Problems



# 中耳毛病

在下面的圖裏耳朵其中一部分劃上了圓圈，這個部分稱為中耳。有時液體會積聚於中耳內，就在鼓膜後面。這些液體或會受感染，亦可能引致喪失聽力。這些中耳的毛病稱為中耳炎。

中耳毛病十分常見，80至90%的小孩會有至少一次中耳毛病。

# 治療


- 如認為孩子耳朵受感染，馬上見醫生。
- 耳朵受感染通常可用醫生給予的藥物治療。
- 服完所有藥物後，再去見醫生。確保那些液體或感染已經消失，是很重要的。
- 中耳有毛病的小孩可能需要接受聽力測驗。這項測驗會顯示聽力是否喪失，以及中耳功能是否正常。
- 進行聽力測驗的最適當人選是聽力學家，他們受過測驗幼兒聽力的訓練。

# 跡象與癥狀

要知道小孩耳朵是否有毛病，可能不容易。留意有沒有這些跡象：

- 耳朵繃緊
- 耳朵作痛
- 發燒或發冷
- 聽覺比平常差
- 似乎不留心
- 開口說話比其他小孩遲
- 行為問題
- 急躁或脾氣壞

(並非所有小孩都有相同癥狀)



# 耳朵的組成部分

要防止問題持續下去，治療是很重要的。

小孩喪失聽力，學習及發展正常言語會有困難。