

## 急症部門 Emergency Department 靜脈注射抗生素治療 Antibiotic IV Therapy

### 一般資訊 General Information

您因為受到感染而需進行靜脈注射抗生素治療。醫生認為您的情況尚好，毋須住院，但請您每天回來接受靜脈注射。您每次到來，都會有醫生評估您是否仍需繼續接受靜脈注射治療。如您仍有受感染的癥狀，例如發燒（體溫超過38.0°C），及/或受感染部位疼痛加劇、腫脹、滲液或發紅，切記告訴醫生或護士。

您離院返家時，身上的靜脈注射導管不會拆除，以便您每天到來急症部門時，能節省療程時間。靜脈注射導管（IV）是用來輸送藥物進靜脈內的一根細小柔軟喉管。我們在導管上貼上塑膠繃帶，以固定其位置。無論正在家中或上班工作，您均須小心處理導管。

### 說明 Instructions

處理導管：

- 時刻保持導管潔淨乾爽。
- 淋浴或洗澡時，用塑膠包裹物料或塑膠袋封好導管，以免弄濕。
- 不要碰觸或擠壓導管。
- 如導管四周疼痛或紅腫，請告知護士。
- 如看到導管有血，毋須擔憂，這並非不尋常的情況。
- 如導管意外脫落，便將整塊繃帶除下，用紗布或清潔紙巾緊按導管插入部位，直至出血停止，然後將繃帶和導管當作垃圾棄掉。

### 處理傷口 Taking Care of Your Wound:

您的傷口，並非一定以繃帶覆蓋，因為這視乎受感染部位在哪裏而定。

- 時刻保持感染部位清潔乾爽。
- 接觸傷口前後均須洗手。
- 如果繃帶弄濕或弄污，以潔淨繃帶更換。
- 如果感染部位在手臂或腿上，試試把受感染的臂或腿提高，以舒緩疼痛及腫脹情況。

**如在下次復診之前出現下列任何情況，馬上返回急症部門，或致電911求助：  
Return to the Emergency Department prior to  
your next scheduled visit, or call 911, if any of the following develop:**

- 呼吸短促及/或呼吸困難。
- 心跳十分急促。
- 頭腦混亂、頭暈目眩或昏迷(失去知覺)。
- 舌頭、嘴唇、口部或臉龐腫脹。

**如需更多資訊，請電811，與HealthLinkBC (卑詩健康結連) 聯絡。**

For more copies, go online at <http://vch.eduhealth.ca> or  
email [pchem@vch.ca](mailto:pchem@vch.ca) and quote Catalogue No. **EA.200.A58.CN**  
© Vancouver Coastal Health, February 2017

本文件內資料只限獲得醫療小組提供這些資料的人士使用。  
The information in this document is intended solely for the  
person to whom it was given by the health care team.  
[www.vch.ca](http://www.vch.ca)