

急症部門 Emergency Department

## 膿腫 (癤子) Abscess (Boil)

### 簡介 General Information

膿腫（亦稱為癤子）是皮下感染而導致的化膿腫塊，會令人感到疼痛。毛囊（皮下毛髮生長的囊）被細菌感染後會引發膿腫。雖然膿腫多出現在頸背、面部、腋下和臀部，但也可能出現在任何毛髮生長的地方。膿腫在初期一般較小，但會快速長大；通常膿腫越大就越疼。

治療膿腫的辦法是切開膿腫，將膿引流出來。醫生將會保證在你離開急症部門前，切開膿腫。大多數患膿腫的病人不需要使用抗生素。

### 如何處理 Instructions

1. 在傷口愈合期間，用綑帶蓋住患處，以保持乾淨，綑帶會吸收流出的膿。注意保持綑帶乾淨和乾燥。
2. 24小時後可以更換綑帶。如果綑帶黏在傷口上，請用溫水浸泡後取下。在貼上新的綑帶前，請先用溫水和肥皂輕輕地清洗傷口周圍。
3. 每日更換綑帶，直到傷口痊愈為止。

如果出現以下任何情況，請去看家庭醫生：

**See your Family Doctor if any of the following develop:**

- 體溫升高或發燒。
- 傷口閉合，或者膿不再流出，而且傷口變大，更加疼痛。

如需更多資料或有任何疑問，請電811，與HealthLinkBC聯絡。

For more copies, go online at <http://vch.eduhealth.ca> or  
email [phem@vch.ca](mailto:phem@vch.ca) and quote Catalogue No. **FO.724.A37.CN**  
© Vancouver Coastal Health, January 2016

本院醫護人員派發這份資料，祇給指定人士使用。  
The information in this document is intended solely for the  
person to whom it was given by the health care team.  
[www.vch.ca](http://www.vch.ca)