

急症部門 Emergency Department 副睪炎 Epididymitis

一般資訊 General Information

副睪炎是精液流過的小型盤管(副睪)的紅腫。這條管子位在每側睪丸的後面。腫脹可能發生在單邊或兩邊的睪丸。

病因 Causes

- 尿道感染
- 性病
- 前列腺肥大
- 前列腺術後
- 動過與尿道有關的手術後

症狀 Symptoms

- 單側或兩側睪丸的腫脹
- 陰囊疼痛
- 腹股溝疼痛
- 小便時疼痛
- 性交或射精時疼痛
- 發燒
- 陰莖分泌物
- 精液帶血
- 下腹疼痛(胃痛)

未完……

注意事項 Instructions

- 服用所有處方藥
- 若感染是由性交傳染，您的性伴侶或需接受藥物治療
- 用冰敷袋減緩疼痛和腫脹。把冰敷袋用布包裹後每隔1-2個小時敷上15分鐘以緩解疼痛
- 休息
- 躺下時用一條摺疊或捲起的毛巾放在陰囊下會有助於減緩腫脹或疼痛
- 彈性下體護罩或貼身短內褲有助於減緩疼痛。它們會提供支撐。
- 如果您有感染請不要性交，直到感染清除為止
- 成藥中的消炎藥如布洛芬(Advil 或 Motrin) 可能有助於減緩疼痛。

如有下列情況請去看您的家庭醫生:

See your Doctor if any of the following develop:

- 用藥3天後症狀不見好轉
- 藥物無法緩解睪丸的疼痛
- 陰囊長瘡或流膿

如有下列任何一種情況出現，請立即返回急症部門求助:

Return to Emergency if any of the following develop:

- 陰囊呈紫色或藍色
- 發燒超過 38°C (100.4°F)
- 迷茫困惑

若需更多資訊或有問題請打811，聯絡卑詩健康連結 (HealthLinkBC)。

For more copies, go online at <http://vch.eduhealth.ca> or email pchem@vch.ca and quote Catalogue No. **GA.500.E65.CN**
© Vancouver Coastal Health, November 2015

本院醫護人員派發這份資料，祇給指定人士使用。
The information in this document is intended solely for the person to whom it was given by the health care team.
www.vch.ca