

Diễn tiến, tiếp theo

Bác sĩ sẽ luôn ngón tay vào trực tràng (ruột thẳng) quý vị để khám. Sau đó bác sĩ sẽ nhẹ nhàng luôn ống nội soi đại tràng (ruột già) sigma vào trong hậu môn của quý vị. Bác sĩ có thể bơm hơi vào ống nội soi đại tràng sigma để thấy rõ hơn. Hơi này có thể làm quý vị cảm thấy đau bụng hoặc đầy bụng. Bác sĩ có thể luôn các dụng cụ qua ống nội soi để lấy sinh thiết hoặc cắt bỏ polyp.

Sau khi nội soi đại tràng sigma bằng ống dẻo

Quý vị có thể cảm thấy đau bụng hoặc đầy bụng vì hơi chúng tôi bơm vào qua ống nội soi trong khi thực hiện phương thức này. Nếu chúng tôi không gây mê thì quý vị có thể ăn uống bình thường và sinh hoạt bình thường trong ngày sau phương thức này. Nếu có chảy máu chút ít vài ngày sau đó cũng là chuyện bình thường. Hãy đến Phòng Cấp Cứu gần nhất nếu quý vị thấy chảy máu nhiều, sốt hoặc ớn lạnh.

Kết Quả

Sau khi nội soi đại tràng sigma, bác sĩ sẽ nói chuyện với quý vị về kết quả nội soi trước khi quý vị ra về. Nếu chúng tôi có lấy mẫu mô, chúng tôi sẽ phân tích mẫu thử nghiệm này trong khoảng hai tuần. Nếu mẫu này không bình thường, bác sĩ chuyên khoa sẽ gọi cho quý vị để nói chuyện về kết quả này và xếp hẹn nếu cần thiết.

Thắc Mắc

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì, xin nói chuyện với bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ chuyên khoa.

Chi tiết trong tài liệu này chỉ dành cho người được toàn chăm sóc sức khỏe giao tài liệu này.

Vietnamese

What is Flexible Sigmoidoscopy?

Nội Soi Đại Tràng Sigma Bằng Ống Dẻo là gì?

Định Nghĩa

Nội soi đại tràng (ruột già) sigma bằng ống dẻo là một cách để bác sĩ xem xét nội mạc (màng trong) trực tràng (ruột thẳng) và một phần đại tràng (ruột già) của quý vị. Phương thức này do một bác sĩ chuyên khoa dạ dày ruột thực hiện, đây là bác sĩ được đào tạo chuyên môn về dạ dày và đường ruột.

Bác sĩ dùng một dụng cụ được gọi là ống nội soi đại tràng sigma dẻo. Đây là một ống dẻo có đèn ở đầu ống. Bác sĩ có thể luân các dụng cụ qua ống này để lấy mẫu mô (sinh thiết) hoặc cắt bỏ polyp.

Tại sao chúng tôi nội soi đại tràng sigma bằng ống dẻo?


Phương thức này giúp bác sĩ chẩn đoán các vấn đề trong trực tràng và đại tràng.

Rủi ro

Cũng như bất cứ phương thức y khoa nào, có các rủi ro khi nội soi đại tràng sigma bằng ống dẻo. Tuy nhiên, hiếm khi xảy ra biến chứng. Có khoảng 1 trong 10,000 người được nội soi đại tràng sigma bằng ống dẻo bị biến chứng. Các biến chứng có thể xảy ra gồm:

- nhiễm trùng
- thủng, hoặc rách nội mạc đại tràng hoặc trực tràng.
- chảy máu ở chỗ chúng tôi lấy sinh thiết hoặc cắt bỏ polyp.

Bác sĩ sẽ cho quý vị biết thêm về các rủi ro trước khi quý vị ký mẫu ưng thuận cho thực hiện phương thức này.



Quý vị chuẩn bị như thế nào cho phương thức nội soi đại tràng sigma bằng ống dẻo

Thông thường quý vị cần nhịn rửa ruột khoảng một giờ trước khi thực hiện phương thức này. Một số người cần dùng thuốc xổ và giới hạn ăn uống. Bác sĩ chuyên khoa sẽ cho quý vị biết chi tiết khi gặp quý vị trước ngày thực hiện phương thức này.

Quý vị có thể tiếp tục dùng hầu hết các loại thuốc. Hãy cho bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa biết nếu quý vị đang dùng bất cứ loại thuốc làm loãng máu nào.

Số này gồm cả Coumadin (warfarin), heparin, Plavix (clopidogrel), và Aspirin (ASA hay acetylsalicylic acid). Ngoài ra, cũng nhớ cho bác sĩ chuyên khoa biết nếu quý vị bị dị ứng với bất cứ loại thuốc nào.

Diễn tiến

Nội soi đại tràng sigma bằng ống dẻo sẽ mất khoảng mười lăm phút. Phương thức này có thể được thực hiện an toàn và thoải mái mà không cần gây mê cho quý vị. Chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị tụt quần áo che hạ bộ xuống. Nếu quý vị muốn được gây mê, chúng tôi sẽ truyền thuốc mê vào tĩnh mạch (IV) ở cánh tay hoặc bàn tay. Chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị nằm nghiêng bên trái và co hai đầu gối lên ngực.

còn tiếp, mặt sau